



DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (PEDv)

Características de la enfermedad:

- Es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que afecta a los cerdos.
- Es causada por un virus de la familia Coronavirus, relacionado al virus de la Gastroenteritis Transmisible del Cerdo (TGEv), con la cual comparte algunas similitudes.
- No se trasmite al hombre ni afecta las características de la carne.
- **Tiene un período de incubación corto, de DOS (2) a CUATRO (4) días.**
- **En LECHONES se presenta en forma aguda con diarrea acuosa amarillenta severa y muerte por deshidratación. Presenta una ALTA MORTALIDAD** (promedio CINCUENTA POR CIENTO (50%) hasta el CIEN POR CIENTO (100%).
- **En ADULTOS (cerdas y animales de engorde) provoca diarrea acuosa amarillenta severa y decaimiento con mortalidad baja -UNO POR CIENTO (1%) a TRES POR CIENTO (3%)-.**
- La vía de transmisión es directa, fecal-oral.
- **La principal vía de ingreso a las granjas son las personas.** También es importante considerar los **animales infectados, vehículos, equipos, materiales** y alimentos contaminados.
- Para evitar el ingreso a la granja resulta imprescindible reforzar al máximo las medidas de bioseguridad.
- La sospecha de un evento sanitario que responda a los signos descritos debe ser notificada a la brevedad a la oficina local del Senasa. Y debe inmediatamente interrumpir el ingreso y egreso de personas, animales y vehículos en el establecimiento.
- **ACTUALMENTE, NO EXISTEN EVIDENCIAS DE QUE SE ENCUENTRE EN NUESTRO PAÍS.**
- El grado de impacto productivo y económico que produciría la eventual aparición en nuestro país de esta enfermedad, depende en gran parte de las medidas preventivas aplicadas por los establecimientos porcinos.

Consultas e informes: porcinos@senasa.gob.ar