

Consulte al INTA, acérquese al SENASA o consulte a su profesional de confianza  
¡Recuerde que un plan Sanitario y una adecuada Nutrición mantiene la productividad y salud de sus animales y... fundamentalmente de las personas:  
"usted es un eslabón importante en la producción de alimentos saludables".

## Contribuciones para el manejo de producciones porcinas familiares

Proyecto Profam Porcino  
Ballesteros Y Ballesteros Sud, Córdoba



INTA AER Bell Ville,  
Tel.:03537-425213  
/ aerbellville@inta.gov.ar  
/ www.inta.gov.ar



Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca  
Presidencia de la Nación

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez  
AER Bell Ville - Grupo Porcino EEA Marcos Juárez

## MANEJO

1. Identifique los reproductores con Caravana o muescas en la oreja.
2. Lleve registros productivos (servicios, partos, destetes, peso a venta, etc.).
3. Detecte celo en las cerdas con la presencia de padrillos.
4. Planifique los servicios en grupo o bandas, esto le permitirá organizar la venta de lechones.
5. Realice servicios en forma individual y controlada (2 saltos por cerda en celo) solo en este momento juntar con los padrillos.
6. Realice el destete a los 28-35 días.
7. Asegúrese un mínimo de instalaciones de manejo (corral de encierreycepo), deben ser cómodas.
8. Procúrese instalaciones seguras (que no se escapen o mezclen).
9. Las parideras deben tener un sistema antiaplaste de lechones.
10. Consulte los requerimientos nutricionales de cada categoría.
11. Inscríbase en el RENAFA (Registro Nacional de Agricultores Familiares) y saque su RENSPA. Consulte sus ventajas en SENASA.

## SANIDAD

1. Consulte a profesionales veterinarios especializados en porcinos.
2. Separe los animales ingresados (corral de cuarentena) y los enfermos para su control y tratamiento (corral de enfermería)
3. Realice análisis de agua para consumo de los animales.
4. Realice un adecuado manejo de los animales muertos (entierro con cal o incineración.)
5. Ingrese solo animales certificados como libres de Brucelosis y Enfermedad de Aujeszky, realice controles periódicos para estas enfermedades (res. 479/2009 y 63/2013 SENASA).
6. Ante una faena casera realice el control de TRIQUINOSIS en un laboratorio habilitado (muestras a enviar porciones pequeñas de : masetero, diafragma, lengua, pulpa, intercostal)
7. Es aconsejable desparasitar a las madres y padrillos antes del servicio, en las madres repetir, en los 10 días antes del parto.
8. Se recomienda desparasitar los lechones al destete (28-35 días), debiendo esperar un periodo de tiempo para su consumo (ver prospecto del antiparasitario).
9. Prevenga enfermedades de sus animales con el uso de vacunas (parvovirus y leptospirosis aplicando dosis antes del servicio) existen otras vacunas, consulte su aplicación a un profesional.
10. No abuse del uso de antibióticos en la granja, consulte a un profesional.

