



### **Efecto directo del incremento de peso del lechón al destete.**

Por Edi G. Castellanos

Peso mayores a 6 kilos al destete estan directamente relacionados en U.S.\$ 31.00 por vida útil de la cerda como consecuencia de un menor uso de sustitutos de leche y preiniciadores y U.S.\$ 81.00 por efecto de una mejora en conversión alimenticia en el engorde por vida útil de la cerda, es decir que un mejor peso del lechón destetado tiene una influencia directa de \$.110.00 por vida útil de la cerda.

Otros beneficios directos como consecuencia de destetar lechones mas pesados al destete.

- **Mas kilos por cerdo vendido, debido a mayores pesos a la misma edad de venta.**
- **Una considerable baja en el costo por consumo de alimento como consecuencia de una disminución en el consumo de sustitutos de leche y preiniciadores y un efecto directo en eficiencia en conversión alimenticia.**
- **Menor porcentaje de mortalidad y grupos mas homogéneos**
- **Menor costo de tratamientos.**

#### **IMPACTO DEL PESO AL DESTETE**

<b>Kg. Destete</b>	<b>Peso Final (kg)</b>	<b>Edad a 125 Kg.</b>
<b>4.1 a 5</b>	<b>119.2</b>	<b>177</b>
<b>5 a 5.9</b>	<b>122.8</b>	<b>167</b>
<b>5.9 a 6.8</b>	<b>125.4</b>	<b>168</b>
<b>6.8 a 7.7</b>	<b>124.0</b>	<b>164</b>
<b>7.7 a 8.6</b>	<b>126.0</b>	<b>163</b>
<b>&gt; 8.6</b>	<b>126.8</b>	<b>162</b>

#### **ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PESO AL DESTETE.**

1. Las primerizas de reemplazo deben tener una excelente conformación de la glándula mamaria con un mínimo de 12 pezones funcionales.
2. Las primerizas deben de cubrirse o inseminar con un peso mínimo de 140 kilos.
3. Limitar la ganancia de peso en la etapa de gestación
4. Las cerdas deben lactar usando todos sus pezones funcionales
5. Las cerdas en su primer parto deben ser desafiadas a producir leche con 12 a 13 lechones sanos grandes y vigorosos.
6. Limitar el manejo de inducción de parto solo en aquellos casos que sea absolutamente necesario.
7. Asegurarse del consumo de calostro de los lechones durante las primeras 12 horas de vida.
8. Esforzarse por estimular el consumo de alimento de las cerdas en maternidad.
9. Destetar lechones de 20 dias de edad o mas.



**LACTANCIAS MAS LARGAS PRODUCEN CAMADAS MAS GRANDES EN EL SIGUIENTE PARTO.**

[<===Anterior](#)

[Siguiete===>](#)

Todos los derechos reservados © www.masporcicultura.com

Diseño web: ecastellanos

