


TRIQUI NOSIS

CON SIMPLES MEDIDAS
PODEMOS PREVENIRLA


 **senasa**

 **Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación**

**www.
senasa
.gob.ar**

Av. Paseo colón 367 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 **senasa**



Triquinosis

Es una enfermedad zoonótica producida por un parásito llamado *Trichinella spiralis*. Es un pequeño gusano que se aloja en la carne de los animales parasitados. Afecta principalmente a los cerdos, aunque también puede encontrarse en otros animales domésticos o silvestres.

» Las personas también pueden contraer triquinosis y enfermarse.



Imagen ampliada de una larva de *Trichinella spiralis* alojada en la carne

¿Cómo se contagian los cerdos?

Al ser criados en malas condiciones de higiene y alimentados con basura o carne de animales muertos parasitados. Los cerdos que están parasitados no demuestran tener la enfermedad a simple vista, aunque sí alojan a los gusanos (larvas) en sus músculos.

¿Cómo podemos prevenir que los cerdos se parasiten?

» mejorando las condiciones de crianza y alimentación de los cerdos.

Si usted es productor o tenedor de cerdos, le recomendamos que:

Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y cría de cerdos.

- » No alimente a los cerdos con basura y restos de alimentos de restaurantes o comercios urbanos.
- » Evite la acumulación de basura y malezas en los criaderos.
- » Combata a los roedores.
- » Si realiza la faena de un animal (cerdo, jabalí, puma) es importante que sea analizada una muestra de entraña de cada individuo antes de elaborar chacinados.

- » Consulte en su municipio a que laboratorio debe remitir estas muestras para confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.
- » No consuma los productos sin antes conocer los resultados de los análisis del laboratorio indicado.
- » Tenga en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito, el salado y el ahumado debe realizarse con carne negativa a triquinosis.

¿Cómo se contagian las personas?

Al comer carne fresca de animales parasitados, cruda o mal cocida, sin su correspondiente análisis de laboratorio para triquinosis. Al ingerir alimentos derivados del cerdo (embutidos y salados), elaborados en forma casera o comprados en la calle o a la vera de las rutas, hechos con carne parasitada sin control bromatológico. Si una persona consume alimentos elaborados con carne cruda o mal cocida proveniente de un cerdo parasitado, puede contraer triquinosis y enfermarse.

la sospecha o la presencia de cerdos con triquinosis debe ser notificada de manera inmediata a la autoridad sanitaria más cercana: oficina del Senasa o autoridades locales.