



#### PROGRAMA DE MANEJO DE LECHÓN

En la actualidad es importante mejorar nuestro sistema de trabajo a través de la implementación de pautas de manejo en todas las áreas de la granja. Una manera sencilla de comenzar por el manejo del lechón al momento del parto hasta el destete. La idea es de refrescar ciertas medidas de manejo zootécnico y la alimentación en las primeras edades, a fin de lograr un manejo estatus sanitario, óptimo crecimiento y una ganancia de pesos excelente a través de un adecuado desarrollo del sistema digestivo del cerdito, de manera que pueda responder eficientemente a los distintos alimentos a lo largo de su vida productiva.

Es interesante revisar todos los factores inherentes al galpón de maternidad, tal es el caso de: tipo de infraestructura, fuente de luz, control de temperatura, corrientes de aire, disponibilidad de agua, material y diseño del paritorio y si contamos con personal calificado, entre otros. Si la conjunción de todos estos factores y las medidas de manejo son adecuadas es seguro que tengamos ganancias en nuestro negocio. Galpón de Maternidad  
Colocar las cerdas próximas al parto por grupo de partos semanales. Manejo del lechón recién nacido. Al nacimiento: garantizar buena fuente de calor.

- Atención al parto, una vez que la cerda expulsa el primer lechón.
- Secar al lechón con papel absorbente y retirar envolturas placentarias.
- Atar y curar el ombligo, con tintura de yodo al 7%.
- Corte de cola y descolmillo.
- Garantizar el consumo de calostro, para asegurar buena protección inmunológica.
- Emparejamiento o nivelación de camadas de acuerdo a su tamaño.
- Piquetes de identificación
- Colocar fuente de calor y debe asegurarse por espacio de 7-10 días, a una temperatura de 30 a 32°C; ya que por debajo de ésta se pueden encontrar problemas de hipotermia, incluso muerte por aplastamiento. También es importante controlar la corriente de aire frío al comenzar y durante las noches, con el uso de cortinas de polipropileno. Debe tomarse el tipo de piso de nuestra granja, bien si es de cemento o de rejilla, pues a través de ésta puede entrar frío y fomentar aplastamientos durante las noches.
- Limpiar el paritorio una vez que termina el parto.
- Pesar camadas.
- Evitar mojar lechones



2do- 3er día de edad: Aplicar IM de 2ml. de Hierro dextrano en el cuello con aguja desechable. Es recomendarle suministrar un producto lácteo acompañante acidificado como refuerzo a la lactancia de la cerda, este aporte es importante, porque permite que haya un desarrollo uniforme de las camadas en el caso que sea muy numerosa, por enfermedad o por muerte de la madre. Reduce la mortalidad e impide la proliferación de bacterias patógenas debido a su carácter ácido. Aparte de todos estos beneficios, el lacto acompañante ayuda a incrementar el peso de la camada en un 20-30% más. Puede suministrarse hasta el día del destete. Castración y desinfección de la herida, es tentativo el uso de algún antibiótico de amplio espectro. Tratamiento preventivo anticoccidiano.

7mo-8vo día de edad: Dar alimento preiniciador granulado ad libitum en comederos para lechones, desde 6-8 días hasta 18 días de edad. Este alimento, va a permitir desarrollar la fisiología del lechón y su sistema inmuno-enzimático digestivo. Se recomienda complementar la alimentación del lechón con el lacto acompañante, en agua, fría o templada hasta el día del destete.

Al utilizar este suplemento garantizamos un incremento de 2kg más por lechón a los 21-22 días de edad (de 4,50 a 6,00-6,50kg) y se llega a destetar el 100% de los lechones. A partir de aquí, el lechón comienza a consumir pequeñas cantidades de alimento y es el momento óptimo para ayudarlo a que

se desarrolle bien, ya que está cerca del momento del destete una vez que arribe a los 21-28 días de edad.



Tipos de destete:

1. Destete parcial: consiste en separar los lechones más grandes y pesados esa semana y los pequeños la siguiente semana de manera que lacten una semana mas (madre nodriza) y se emparejen con los de la semana siguiente.
2. Destete total o radical: consiste en destetar todos los lechones, tanto grandes y pequeños, esa misma semana de destete.
3. Destete precoz: Consiste en destetar antes de los 21 días de edad, requiere condiciones de manejo alojamiento y alimentación especiales.

**Algunas consideraciones sobre el destete precoz:**

1. **Ofrecer alimentación muy bien balanceados.**
2. **Alta digestibilidad y palatabilidad.**
3. **Ambiente adecuado.**
4. **No hacerlo en granjas con manejo deficiente.**
5. **Contar con personal especializado**

[<===ANTERIOR..... SIGUIENTE===>](#)

Todos los derechos reservados © www.masporcicultura.com

Diseño web: edcastellanos

