

Recorte funcional de las pezuñas para mejorar la motricidad de cerdas reproductoras

Fuente: Extraído de PorciNews



En un estudio realizado por la Universidad de Georgia (EE.UU), se evaluó la marcha de las cerdas antes y después del recorte de pezuñas.

La aparición de cojeras es una de las principales causas de sacrificio de reproductoras, ya que afecta negativamente los parámetros productivos y reproductivos. La presencia de los espolones y el sobrecrecimiento de la pezuña son las desencadenantes más frecuentes de las cojeras.

Se ha comprobado que la prevalencia de cojeras es superior en cerdas gestantes alojadas en grupo , en comparación con las alojadas en jaulas individuales. Este hecho se asocia al diseño de los corrales, que permite una movilidad a las cerdas y aumenta las probabilidad de que se lesionen.

Tinkle et al., argumentan que es posible prevenir, e incluso corregir algunas cojeras mediante el recorte funcional de las pezuñas. Los hallazgos de su estudio apoyan la teoría de que, debido a un incremento de la fuerza horizontal, cuanto más alejado se encuentra la extremidad del centro de gravedad, al tener un apoyo digital, más fácil es que resbalen.

Los autores constataron, a las 48 horas de haber hecho el recorte de pezuñas, una mejoría en la actividad locomotora, y una disminución de las cojeras.

Los autores constataron, a las 48 horas de haber hecho el recorte de pezuñas, una mejoría en la actividad locomotora, y una disminución de las cojeras.

Leer el artículo completo en [http://www.livestockscience.com/article/S1871-1413\(16\)30228-1/abstract](http://www.livestockscience.com/article/S1871-1413(16)30228-1/abstract)

