

## Traspaso de camadas

Fuente: <http://www.elsitioporcino.com>

El traspaso de camadas completas reducirá el estrés que normalmente experimentan los lechones al ser movidos y mezclados con un grupo de nuevos compañeros de camada, brindando a los lechones más débiles la oportunidad de recuperarse a través de una mejor ingesta de leche. Informe de BPEX, Inglaterra, en el no. 12 de su serie 'Work Instructions'.



La inter-adopción es una práctica recomendada para emparejar el tamaño de las camadas y el peso de los lechones al nacer, después del parto. Si los lechones empiezan luego a retrasarse, generalmente se les cambiará por un lechón más fuerte de otra camada, o se crea una nueva camada para los lechones más pequeños.

Sin embargo, cada vez que los lechones se mezclan con nuevos compañeros de camada, toma tiempo para que puedan volver a establecer la jerarquía de amamantamiento, y puede resultar en falta de consumo de alimento y un menor rendimiento.

La inter-adopción de camadas completas reducirá el estrés normalmente experimentado por los lechones de ser movidos y mezclados con un nuevo grupo de compañeros de camada, mientras que proporciona a los lechones más débiles la oportunidad de recuperarse a través de una mejor ingesta de leche.

<b>Equipo requerido</b>
<b>Suplemento para lechones</b>
<b>Carrito o caja para hacer la inter-adopción</b>
<b>Marcador bolígrafo/spray</b>
<b>Tiza</b>

## El proceso

- Traslade toda la camada cuando contiene un número de lechones que están mostrando signos de viabilidad reducida, a una cerda que tiene buena producción de leche.
- La marrana receptora debe ser una cerda joven o que previamente haya adoptado bien lechones y debe estar amamantando una camada fuerte y uniforme
- Traslade la camada fuerte a la puerca de donde procedió la camada más pequeña.
- Después de la inter-adopción, las cerdas seguirán con sus curvas normales de alimentación

Una camada uniforme y fuerte puede fomentar a una cerda que está mostrando signos de poca producción de leche a empezar a producir leche otra vez.



## Recuerde

- La diferencia de edad entre las dos camadas no debe exceder cuatro días
- Deberá colocar el mismo número de lechones en las dos camadas
- Todos los lechones deben ser saludables
- El intercambio entre las camadas debe ser directo, p. ej. las cerdas no deben quedar sin lechones durante un período prolongado
- Después del intercambio debe dar un trato especial a la camada más pequeña, p. ej. una lámpara de calor extra, un poquito de suplemento para lechones, etc.

Tan pronto como haya signos de menor rendimiento y que se están retrasando un mayor número de lechones, se debe realizarse el intercambio de camada.

## ¿Falta de éxito?

Es probable que la inter-adopción falle si:

- El intercambio se hace demasiado tarde; los lechones de la camada más pequeña pueden ser demasiado débiles para mamar
- La hembra con la camada pequeña está enferma
- La camada pequeña está enferma
- La cerda tiene mal capacidad maternal y no deja que los lechones mamen
- La camada está inquieta porque la cerda no está dispuesta a dejarlos mamar

La vigilancia es clave para que la inter-adopción de camadas sea una herramienta de gestión exitosa.

Un intercambio exitoso conducirá a lechones más uniformes, un mejor rendimiento de los lechones y una menor mortalidad.