



[Inicio](#) | [Artículo](#) | [Últimos](#) | [Productos](#) | [Recomendados](#) | [Estatística](#) | [Publicidad](#)

MANEJO DE LOS CERDOS EN FINALIZACIÓN

Jose Enrique Piva

Gustavo Pizarro

Road Show PIC 2010



Fuente de Cerdos Saludables

Piense como si Usted comprara para si mismo los cerdos

- **Conozca la Genética**
 - Predicción del desempeño y grado en el Rastro
- **Conozca la Salud**
 - Consulta Veterinario-Veterinario
- **Aumento en edad/peso destete**
 - > edad = > peso de ingreso; costos de alimentación reducidos
- **Tamaño de lote, para llenado rápido, a menos días como sea posible**
 - Administre el presupuesto de alimento a la edad de los cerdos.
- **Minimice los cerdos defectuosos o rechazados.**
- 1200 de entrada y 25 rechazados = 2% de espacio ineficiente



Fuente de los flujos

- **Metas**
 - **Utilización adecuada de la nave**
 - Llenar a recomendación por metro cuadrado por animal
 - Acorte el tiempo de llenado
 - La meta es de <7 días
 - **Reducir la mezcla de fuentes**
 - “Estandarice” el estatus de PRRS
 - Virus y agentes comunes
 - Reducir agentes secundarios
 - Una sola fuente para el cerdo más sano.

Opciones de fuente para un sistema

- **Estatus de la granja de Cerdas**
 - Agrupe de acuerdo al estado actual
 - Negativo a PRRS
 - Estable a PRRS
 - Activo a PRRS
 - Aclimatización en hato de acuerdo a la fuente de reemplazo de Primerizas.

Opciones para Flujo

Segregación por paridad

– Razones

- Las cerdas de paridad más joven poseen menor inmunidad.
- Desempeño disminuido de las camadas de primerizas.
- Incrementa la salud a través del sistema
- Ahorro en costos de medicación

– Procedimiento

- Todas las primerizas paren en una sola granja sitio I.
- El flujo de estos cerdos separados de P2 > camadas
- ¿Por qué?
- Incrementa el desempeño a través del sistema

Diferencias entre primerizas y multiparas

Datos	Progenie de Primerizas	Progenie P2 +
Peso Destete (kg)	5.30	5.74
Mortalidad en Destete (%)	3.17	2.55
ADG Destete (g/d)	412	435
Costo de medicamentos en Destete(CDN \$)	2.15	0.85
Mortalidad en Finalización (%)	4.31	2.95
ADG Finalización(g/d)	735	763
Costo de medicamentos en Finalización (CDN \$)	1.82	1.01
Pulmones con lesiones de neumonía enzootica (%)	31	11

Adapted from C. Moore, 2001 (más de 5000 cerdos por columna)

Comience en la Dirección Correcta

Destete cerdos de 20-22 días (mínimo 17 días)

Todos los cerdos de calidad inferior retirarlos antes de la entrada.

Las instalaciones deben estar limpias y secas.

Considere cada llenado como su oportunidad para comenzar de nuevo

- Asegúrese que la nave no es la fuente de la enfermedad.

Todo Dentro - Todo Fuera.

- 4 pasos para un lavado adecuado

1. Lave con agua caliente (use desengrasante)
2. Inspección
3. Desinfección

Pasos para un comienzo saludable

1. Lave todo de arriba a abajo
 - Techo, paredes, piso, comederos, línea de alimentación, agua, tapetes, cortinas, tolva, pasillos y oficina – **todo** (jeringas, herramienta, botas, oficina, ropa, etc.)
2. Inspección
 - NADA DE ESTIERCOL
3. Desinfecte
 - Rote
4. Seque
 - Una vez que ya no haya estiércol y las instalaciones estén secas, está listo para el ingreso de los cerdos.

Inspeccione a su manera para obtener cerdos sanos.



Conocimiento es la Clave

Conozca la historia de los cerdos desde la fuente de cerdas.

- Muchos sistemas con muchos planteamientos
- Algunos destetan diario, muchas veces/semana, una vez a la semana, etc.
- Presupueste el alimento
- Si la granja de cerdas retiene cerdos por una semana cada cerdo requerirá un presupuesto diferente de alimento
- Comuníquese con la fuente, marque los cerdos de acuerdo a la edad de destete.
 - 7 día, 4 día y 1 día destete

Obtenga el inicio correcto

Previo a la llegada de los cerdos

- Precaliente el corral (12 horas)
- Ponga la ventilación para el nuevo grupo
- Verifique las entradas y los ventiladores
- Adecue los ajustadores de los comederos, coloque alimento.
- Revise y ajuste el flujo/altura de los bebederos
- Complete cualquier problema de mantenimiento
- Vuelva a llenar de cebo para ratas y fauna nociva
- Conozca el área (m²) para la capacidad de la nave.

Prepárese

Comuniqué la mortalidad/desempeño del destete o doble llenado destete/finalización

De Destete

- Que % de cerdos pequeños/tratados se encuentran allí
- Base de corrales que necesitan llenarse
 - Necesito 1 corral para pequeños y 1 corral para recuperados o necesito 2-3 de cada uno.
 - Coloquelos en el lugar más caliente, deje espacio libre en el corral, mismo comedero
 - Divida el corral de enfermos si es posible

De doble llenado destete/finalización

- Mismo que el anterior
- Tenga una decisión adecuada para mover los cerdos más pequeños o mantenerlos en el corral original.

Antes de la llegada

Alimente en comedero (llene solo lo suficiente para 2 días)


- Ligeramente abra el ajuste del comedero
- Alimento a cubrir la charola en un 25-50%
 - Es deseable el acceso fácil a la comida para un inicio
- Solo llene los comederos para los cerdos que ingresan

Verifique la altura y cantidad de flujo del bebedero

- Manualmente permita que corra para tener agua fresca fría.
- Baje la altura pero que esté lista para ajustarse después de la llegada.

Ajuste de comederos en Destete

Figura 1: Adecuado Ajuste de los Comederos de Destete



Después de la 1^{ra} semana 50% del plato debe estar cubierto



1st semana 25%-50% del plato debe estar cubierto



PROXIMAMENTE LA SEGUNDA PARTE DE ESTE ARTÍCULO

[<===Anterior](#)

[Siguiente===>](#)

Todos los derechos reservados © www.greteceg.org
Diseño Web: Edi Castellanos

